

Володимир Кучер.

О двійности в геометрії і фізиці.

І. О двійности в геометрії.

Поняття двійности є запозичене з геометрії, де означає воно правильну зв'язь тверджень, яка увидається у тім, що на основі деяких замінь понять можна твердження двійковим способом взаємно підпорядкувати. Двійність може бути двояка, а саме — геометрична і метрична. Перша займається відношеннями положень в просторі, друга знов метрикою в просторі.

Для пізнання першої двійности вистарчить вказати на прості твердження звичайної геометрії простору, які взаємно з себе виходять через заміну понять:

Точка → площа,
площа → точка,
проста → проста.

Наприклад: Дві точки визначають одну просту, а саме їх лучну. Двійне твердження: Дві площі визначають одну просту, а саме їх грану пересічи.

Дві прості, які переходять через одну точку, лежать в тій самій площі. Двійне твердження: Дві прості, що лежать в одній площі, мають одну спільну точку.

В тих судах поняття простої має значіння інваріанта.

Для вияснення двійности в метричній розумінню можуть служити твердження сферичної тригонометрії і відповідні їм твердження гіперболічної геометрії. Як відомо, — з кожного твердження першої можна вивести твердження другої в сей спосіб, що дійсну вартість луча кулі r заступаємо уявною вартістю ir , або що на одно виходить, коли поміняємо звичайні кутові функції кватів $\frac{a}{r}$, $\frac{b}{r}$, $\frac{c}{r}$ з гіперболічними функціями тих кватів.

І так: Твердженню достав сферичної тригонометрії:

$$\cos \frac{a}{r} = \cos \frac{b}{r} \cos \frac{c}{r} + \sin \frac{b}{r} \sin \frac{c}{r} \cos \alpha \quad (1)$$

відповідає в геометрії гіперболічної площі взір:

$$ch \frac{a}{r} = ch \frac{b}{r} ch \frac{c}{r} - sh \frac{b}{r} sh \frac{c}{r} \cos \alpha; \quad (1a)$$

взірцеви на поверхню сферичного трикутника:

$$p = r^2(\alpha + \beta + \gamma - \pi) \quad (2)$$

відповідає в гіперболічній геометрії взір на поверхню трикутника:

$$p = r^2(\pi - \alpha - \beta - \gamma). \quad (2a)$$

Уклад заміє понять, який ту промощує перехід з одної групи взорів до другої, є ось такий:

$$\begin{aligned} r &\rightarrow ir \\ \cos \frac{a}{r} &\rightarrow ch \frac{a}{r}, & \cos \frac{b}{r} &\rightarrow ch \frac{b}{r}, & \cos \frac{c}{r} &\rightarrow ch \frac{c}{r}, \\ \sin \frac{a}{r} &\rightarrow -ish \frac{a}{r}, & \sin \frac{b}{r} &\rightarrow -ish \frac{b}{r}, & \sin \frac{c}{r} &\rightarrow -ish \frac{c}{r}. \end{aligned} \quad (3)$$

Наведені вище приміри вказують, яку науково-теоретичну вартість має основа двійности. Вона передовсім упрощує галузь науки в сей спосіб, що розділює загал тверджень на дві великі групи, собі взаємно протиставлені. Лучником, що посередничить між обома групами, є підпорядкування понять немов в роді якогось словника так, що знання понять одної групи потягає за собою пізнання другої, о скільки стоять до розпорядимости поняття, які даються взаємно підпорядковувати. Тому основа двійности є дійсно помічним середником, що веде до об'єднання думання; можна її отже уважати логічно-економічною основою.

Хосей основи двійности виступає тим наглядніше, чим ширший є обсяг судів, до яких її стосується. В наведених вище випадках основа двійности була лучником між судами одної і тої самої дисципліни — геометрії. Питання і висліди новішої теоретичної фізики виказують, що основа двійности лучить також дві різні дисципліни, а саме фізику і геометрію.


II. О двійности в геометрії і фізиці.

Праці Германа Мінковського показали нам дорогу, якою можна перейти з області фізикальних явищ в обсяг геометрії. А сею дорогою є чотиророзмірна ріжноманітність, утворена з трирозмірного простору і однорозмірного часу. Нагоду до цього кроку дала Мінковському електродинаміка тіл в русі, з якої опісля повстала спеціальна теорія релятивности А. Айнштайна. Остання, спираючись на класичній основі релятивности і на постулаті постійности скорости світла, дозволила відтворити „світ“ на чотиророзмірній ріжноманітності в евклідовій метриці. Ту по раз перший відкрито двійність між фізикальними і геометричними теоремами. Так відкрита двійність найшла згодом поширення і поглиблення, коли Айнштайн розтягнув постулат рівноправности для опису законів природи на всі уклади віднесення, які можуть довільно порушатися відносно себе. А зробив він це в своїй загальній теорії релятивности, яка є рівночасно теорією гравітації. Справа двійности між фізикальними а геометричними теоремами, яка виринула в спеціальній теорії релятивности, виступила в загальній теорії релятивности ще яркйше. Розуміється, що не можна ту уживати метрики Евкліда; треба було закинути евклідову геометрію, а заступити її ріманівською геометрією. В загальній теорії релятивности маємо сю велику синтезу геометрії і фізики, яка представляє може найбільший крок вперед на дорозі до одноцільного пізнання природи. А при тій синтезі приходить до значіння в цілії повні економічний характер основи двійности.

А. Евклідова геометрія а світ спеціальної теорії релятивности.

Трирозмірний простір є предметом евклідової геометрії. Кожда точка такого простору є все визначена трома числами, які її підпорядковуємо в обранім укладі віднесення; сі три числа називаємо сорядними простору. Фізикальні явища відбуваються в просторі і часі, тому до опису якоїсь події (події точкової) треба вже чотирох чисел, а саме: трох співрядних простору і співрядної часу. З тої причини говоримо, що загал всякого фізикального явища становить чотиророзмірну ріжноманітність, яку називаємо „світом“. Співрядні простору і співрядна часу творять разом „співрядні світа“.

Коли хочемо протиставити собі простір і світ, то покажуться як кінечне в стиснути бодай одну простірну співрядну світа. Тоді світ буде складатися з дворовмірного простору (площі) і часу, так що відтворення його на трирозмірнім евклідовім просторі буде можливе. В таким разі можемо звичайному простірному прямокутному укладові віднесення (x_1, x_2, x_3) протиставити формально такий самий уклад, який, построний з двох співрядних простору (x_1, x_2) і співрядної часу t , представлятиме наш трирозмірний світ (Рис. 1.).



(Рис. 1.)

Коли в укладі сорадних світа поведемо рівнобіжний переріз до площі (x_1, x_2) в якимсь означенім відступі, т. зн. для якогось означеного часу t , тоді поведена площа відтворює всі простірні відношення в хвилі t . Кожний такий переріз рівнобіжний до площі (x_1, x_2) подає відношення в просторі все в иншім часі t ; творить він збір рівночасових відношень в просторі. Такі плоскі перерізи в густо стисненім слідуванню по собі, або инакше площу рівнобіжну до площі (x_1, x_2) , що порушається здовж додатної осі часу, можемо обсервувати на екрані кожного кінематографу.

Своєрідна природа трирозмірного евклідового простору має свій характер в означенню міри. Його основою є теорема Пітагора:

$$d^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2, \quad (4)$$

яка в таким виді означає квадрат віддалення точки (x_1, x_2, x_3) від початку укладу співрядних. Найважнійша істотна прикмета цього означення міри полягає у тому, що величина відступу d не залежить від добору укладу співрядних. Коли вберемо довільно другий прямокутний уклад співрядних (x'_1, x'_2, x'_3) тоді:

$$d^2 = x'^2_1 + x'^2_2 + x'^2_3 = x^2_1 + x^2_2 + x^2_3. \quad (4_1)$$

Говоримо отже, що пітагорейська сума квадратів, яку можемо уважати характеристичною, основною формою метричного евклідового простору, є інваріантом супроти пересунень і скручень укладу співрядних.

Питання, чи цього рода інваріантне означення міри існує у трирозмірнім світі, який що правда може бути відтворений на трирозмірнім просторі, однак в дійсности є від нього зовсім ріжний. Як аналогію до теореми Пітагора для трирозмірного світа з погляду спеціальної теорії релятивности маємо квадратеву форму:

$$s^2 = x_1^2 + x_2^2 - c^2 t^2, \quad (6)$$

де c означає скорість світла. Форма (6) є інваріантом кожної трансформації між двома укладами віднесення, які порушаються з огляду на себе рівномірно і простолінійно. Тому величину s можемо назвати „просторо-часовим відступом“ світової точки (x_1, x_2, t) від початку укладу співрядних O .

Підпорядковуючи отже кожній точці світа означене, від укладу співрядних незалежне число s , т. зн. її просторо-часовий відступ від початку укладу сорядних O , робимо те саме, що зробив у трирозмірнім евклідовім просторі Пітагорас, будуючи свою теорему. В сей спосіб творимо в світі метрику незалежну від укладу віднесення, а в ній уґрунтуємо геометрію явищ природи. В творенню цюї геометрії нема ніякої довільности, бо дорогу до неї показали строгі досліди фактів природи.

Питома прикмета цього нового уняття природи світа полягає в тім, що ним вводимо фізику в область геометрії; тим самим промощуємо дорогу між обома дисциплінами, яка веде з геометричного простору в світ явищ природи і навпаки зі світа до простору; а вираженням сього є субституція:

$$x_3^2 = -c^2 t^2, \text{ або: } x_3 = +ict, \quad (7)$$

яка перетворює основну метричну форму світа:

$$x_1^2 + x_2^2 - c^2 t^2$$

на основну метричну форму трирозмірного евклідового простору:

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2.$$

Субституція (7) лучить обсяг геометрії з обсягом фізики і навпаки. Показує вона, що хотяй час t як такий є в істоті чужий для змінних простору, однак уявна вели-

чина ict має характер співрядної простору, подібно як x_1 і x_2 .

Субституція (7) веде до взаємної відповідності на переміну геометричних і фізикальних теорем та протиставить двійно просторови — світ. Завдяки їй можна отримати з чисто геометричних зв'язків фізикальні і навпаки кожна фізикальна правильність мусить відбиватися в такійже геометричній. Існування двійности фізики і геометрії унаглядняють нижше подані її приміри.

a) Евклідова площа (x_1, x_2) — дворозмірний світ (x_1, t) .

Ограничуємось поки-що до таких фізикальних явищ, які відбуваються тільки в однім вимірі, а передовсім в одній простій. Усуваємо отже ще одну співрядну (x_2) , так, що світ зводимо до дворозмірного твору (x_1, t) і можемо його відтворити на плоскім укладі віднесення (x_1, x_2) . Фундаментальна метрична форма цього світа буде:

$$x_1^2 - c^2 t^2, \quad (7)$$

яка через субституцію:

$$x_2 = \pm ict \quad (8)$$


переходить в:

$$x_1^2 + x_2^2, \quad (10)$$

т. зн. в фундаментальну метричну форму евклідової площі (x_1, x_2) . Таким способом буде можна висловлювати твердженнями плоскої геометрії — суди о фізикальних явищах, які відбуваються в одній простій.

1. Проста — рівномірний протолінійний рух.

Евклідову просту в прямокутнім укладі співрядних (x_1, x_2) (рис. 2) виражуємо рівнянням:



(Рис. 2.)

$$x_1 = x_2 \operatorname{tg} \alpha + b. \quad (11)$$

Стосуючи субституцію

$$x_2 = \pm ict$$

до рівняння простої, дістанемо в мові фізики:

$$x_1 = \pm ict \operatorname{tg} \alpha + b. \quad (12)$$

Дістали ми отже лінійну функцію часу t , яка визначає рівномірний рух, в данім випадку на співрядній X_1 . Співчинник

при t представляє скорість руху v . Таким способом дістаємо фізикальне значіння для геометричного поняття кута, а радше для його тригонометричної тангенти, помноженої уявною одиницею. Отже:

$$\text{або: } \left. \begin{aligned} v &= i c \operatorname{tga} \\ \operatorname{tga} &= \frac{v}{i c} \end{aligned} \right\} \quad (13)$$

Підставивши останню вартість для tga у взорі (12), тоді дістанемо просту дворовмірного світа (x_1, t) :

$$x_1 = \pm v t + b, \quad (12 \text{ а})$$

яка визначає рівномірний рух точки оживленої скоростю v в світі (x_1, t) , де b означає відступ точки в часі $t = 0$ від початку O укладу віднесення. Подвійний знак при v говорить, що рух точки може відбуватися або в додатнім або у відємнім напрямі осі X_1 . Задержавши отже подвійний знак при субституції: $x_2 = \pm i c t$ бачимо, що кожній евклідовій простій відповідають у фізиці два рівномірні рухи з однаковою скоростю v , але в противних напрямках на осі X_1 ; при тім можемо обмежити для α інтервал: $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Допустім натомість також відємні вартости для α , тоді для повного опису вистарчить брати:

$$x_2 = + i c t \quad (14)$$

З того виходить, що кожній простій відповідає тільки оден рівномірний рух на осі X_1 , а всім простим з додатнім нахиланням α відповідають рухи з додатними скоростями v в напрямі додатної осі X_1 .

Завважмо дві прості з нахиланнями α' і α'' , то на основі (13) і (14) представляють вони два рівномірні простолінійні рухи зі скоростями v' і v'' , а саме:

$$v' = i c \operatorname{tga}', \quad v'' = i c \operatorname{tga}'', \quad (15)$$

з чого слідує:

$$v' : v'' = \operatorname{tga}' : \operatorname{tga}''. \quad (15 \text{ а})$$

Скорости рухів є пропорційні до кутів нахилання.

2. Скрут укладу сорадних — трансформація Льоренца.

Возмім тепер під увагу скрут укладу співрядних около його початку O . Най α означає кут, о який скрутилася вісь X_2 в додатнім змислі.

Дістаємо отже знані взори (рис. 3):

$$\begin{aligned} x_1' &= x_1 \cos \alpha - x_2 \sin \alpha, \\ x_2' &= x_1 \sin \alpha + x_2 \cos \alpha. \end{aligned} \quad (16)$$

Положім:

$$x_2 = i c t, \quad x_2' = i c t',$$

і:

$$\operatorname{tang} \alpha = \frac{v}{i c} = \frac{\beta}{i},$$

де $\beta = \frac{v}{c}$, та визначім:

$$\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \sin \alpha = \frac{\beta}{i \sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (17)$$

то підставивши ці вираження в рівняння (16), дістанемо:

$$x_1' = \frac{x_1 - \beta c t}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad i c t' = \frac{-i \beta x_1 + i c t}{\sqrt{1 - \beta^2}},$$

або:

$$x_1' = \frac{x_1 - v t}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad t' = \frac{t - \frac{\beta}{c} x_1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (18)$$

т. зв. трансформаційні взори Льюренца.

Спираючись на висновках попереднього уступу, пізнаємо зараз значіння останніх трансформаційних взорів. Викручена о кут α від осі X_2 — вісь X_2' , представляє в фізикальному значінню рівномірний і простолінійний рух обсерватора зі швидкістю v ; він робить свої обсервації в укладі віднесення (x_1', t) . Трансформаційні взори проможуть перехід від подуманого укладу віднесення в спочинку (x_1, t) до укладу, що порушається з релятивною швидкістю v .

Звернути ту треба увагу ще на наступні обставини:

1) Трансформаційні взори (18) мають дійсну вартість під умовою, що:

$$\beta \leq 1, \quad \text{або: } v < c, \quad (19)$$

т. зв. швидкість світла c є в спеціальній теорії релятивності нескінченно великою швидкістю; від неї немає більшої швидкості.

2) Для точки \bar{P} на осі X_1' (рис. 3), яку в рухомім укладі визначає в хвили $t' = 0$ ($x_2' = 0$) відмінок $O'\bar{P} = \bar{x}_1'$ умовленої міри, заходить реляція:

$$\bar{x}_1' = \frac{\bar{x}_1}{\cos \alpha} = \bar{x}_1 \sqrt{1 - \beta^2} \quad (20)$$

Правда, що \bar{x}_1 має таку саму довготу, що \bar{x}_1' , однак беручи річ зі становиська спочинкового укладу в хвили $t = 0$ ($x_2 = 0$), тоді рівняння (20) говорить, що довгота рухомої міри скоротилася у віднесенню до спочинкової довготи у відношенню $1 : \sqrt{1 - \beta^2}$; в це т. зв. контракція Льюренца.

3) Для точки \bar{P} на осі X_2' (рис. 3), в руховім укладі зазначає фізикально годинник, установлений в початку укладу ($x_1' = 0$), якийсь інтервал часу t' — мірений від хвили коінцеденції обох укладів. Співрядня часу рухомого укладу в:

$$\bar{x}_2' = \frac{\bar{x}_2}{\cos \alpha} = \bar{x}_2 \sqrt{1 - \beta^2}, \quad (21)$$

або в мові фізики:

$$\bar{t}' = \bar{t} \sqrt{1 - \beta^2} \quad (21 a)$$

А що інтервали \bar{t} і \bar{t}' , мірені годинником наставленим в початку спочинкового укладу ($x_1 = 0$) в рівні, тому заключаємо з взору (21 a), що в наслідок вірномірного і простолінійного руху укладу зі швидкістю v , хід годинника опізнюється в такій мірі, в якій скорочуються міри довготи.


3. Теорема додавання функції тангентів — теорема додавання швидкостей.

Возмім під увагу три прямокутні уклади співрядних, викручені відносно себе около спільного початку $O = O' = O''$ (рис. 4). Теорема додавання функції тангентів:

$$tg(\alpha + \alpha') = \frac{tg \alpha + tg \alpha'}{1 - tg \alpha tg \alpha'} \quad (22)$$

позволяє обчислити тангенту кута цілого скруту безпосередньо з тангентів кутів подинних скрутів.

По мисли взору (13) маємо:



(Рис. 4.)

$$tg \alpha = \frac{v_1}{ic}, \quad tg \alpha' = \frac{v_{21}}{ic}, \quad tg(\alpha + \alpha') = \frac{v_2}{ic}, \quad (23)$$

де означають: v_1, v_2 скорості układів (x_1', t') , (x_1'', t'') у віднесенню до układu (x_1, t) , а v_{21} скорість układu (x_1'', t'') у віднесенню до układu (x_1', t') . З (22) і (23) дістаємо:

$$v_2 = \frac{v_1 + v_{21}}{1 + \frac{v_1 v_{21}}{c^2}}; \quad (24)$$

а з того дальше дістаємо:

$$v_{21} = \frac{v_2 - v_1}{1 - \frac{v_1 v_2}{c^2}}. \quad (24a)$$

Є це теорема додавання скоростей спеціальної теорії релятивності.


Коли підставимо в (24) $v_1 = c$, одержимо дуже дивний, вислід, а саме:

$$v_2 = \frac{c + v_{21}}{1 + \frac{v_{21}}{c}} = c. \quad (25)$$

Сей вислід дістали ми в попереднім уступі з льюренцової трансформації, а саме, що по думці спеціальної теорії релятивності, ніяка скорість не може перевищити скорості світла.

4. Сінусова теорема — ефект Допплера.

Зауважмо прямокутні układи співрядних (X_1, X_2) і (X_1', X_2') зі спільним початком $O = O'$; осі другого з них творять



(Рис. 5.)

з вісями першого układu кут α . Пове́дїм дальше з початку układів O і в точках P, Q, N рівновіддалені прості рівнобіжні, наклонені до X_2 під кутом γ (рис. 5).

З трикутника OPP' маємо зв'язь:

$$\frac{x_2}{x_2'} = \frac{\sin(\gamma - \alpha)}{\sin \gamma},$$

або:

$$\frac{x_2}{x_2'} = \cos \alpha \left(1 - \frac{\operatorname{tg} \alpha}{\operatorname{tg} \gamma}\right). \quad (26)$$

Підставивши:

$$\operatorname{tga} = \frac{v}{ic}, \quad \operatorname{tg} \gamma = \frac{w}{ic}, \quad (27)$$

дістаємо при застосуванні (14) і (17) двійне твердження фізики:

$$\frac{t}{t'} = \frac{1 - \frac{v}{w}}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (28)$$

якого значіння заналізуємо.

Представмо собі якесь періодичне явище, хай би це був якийсь тяг филь, то обсерватор в початку укладу $O(x_1, t)$ заприміть, що цей самий стан буде знов повертати по впливі якогось відступу часу. Сей відступ часу T буде наворотом дрганья.

Глядач знов в початку рухомого укладу (x_1', t') визначить инший наворот дрганья T' .

Приймім, що скорість розходження филь в нерухомім укладі є w , то геометричний образ світової лінії наворотного стану представляє проста PP' наклонена під кутом γ до осі X_2' , а відтинок OP на осі X_2 є геометричним образом навороту дрганья T . Ця світова лінія перетинає геометричний образ світової лінії глядача рухомого укладу, отже вісь X_2' , в точці P' . Відтинок $O'P' = x_2'$ є образом навороту дрганья T' , який визначує глядач рухомого укладу.

Спираючись на відношенню часів реляції (28), маємо:

$$\frac{T}{T'} = \frac{1 - \frac{v}{w}}{\sqrt{1 - \beta^2}}. \quad (28a)$$

Завважмо дальше, що маємо до діла з фильми світла, тоді:

$$w = c, \quad (29)$$

а в такім разі:

$$\frac{T}{T'} = \frac{1 - \frac{v}{c}}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (30)$$

що подає основу Допплера з погляду спеціальної теорії релятивности. Заступаючи навороти T і T' частотами дрганья ν і ν' , дістанемо:

$$\frac{v'}{v} = \frac{1 - \frac{v}{c}}{\sqrt{1 - \beta^2}}. \quad (31)$$

Коли в тім рівнянні занедаємо 2-ий степеь дроба β , тоді дістанемо:

$$\frac{v'}{v} = 1 - \frac{v}{c}, \quad (31 \text{ а})$$

знаве виражіння на основу Допплера з клясичної оптики.

Кожда з рівнобіжних в рівних відступах (рис. 5), поведених до осі X_2 під кутом γ , є геометричним образом, як вище було згадане, світової лінії якогось означеного, все навертаючого стану руху; на примір можуть вони уявляти геометричні образи світових ліній всіх хребтів филь. В такім випадку ці рівнобіжні є геометричним образом тягу по собі наступаючих филь. Відтинки на осі X_2 :

$$OP = ON = PQ = \dots = x_2$$

дають геометричний образ навороту дрогоання T .

Ця громада рівновіддалених рівнобіжних відтинає на осі X_1 і до неї рівнобіжних відтинки між собою рівні, величини $OR = x_1$, які треба уважати за геометричні образи довготи филь λ , коли x_2 є геометричним образом навороту T .

Сей спосіб розумування примінений до рухомого (викрученого) укладу веде до висновку, що як $O'P' = x_2'$ представляє геометричний образ навороту дрогоання T' , так відтинок $O'R' = x_1'$ є геометричним образом довготи филь λ' для глядача в рухомім укладі. В такім разі:

$$x_1 = \lambda, \quad x_1' = \lambda'. \quad (32)$$

Коли застосуємо до трикутника ORR' синусове твердження, отримаємо:

$$\frac{x_1}{x_1'} = \frac{\cos(\gamma - \alpha)}{\cos \gamma},$$

або:

$$\frac{x_1}{x_1'} = \cos \alpha (1 + \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \gamma). \quad (33)$$

Коли до останнього рівняння введемо взори (17) і (27), дістанемо таку фізикальну звязь:

$$\frac{x_1}{x_1'} = \frac{1 - \frac{v w}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \left(\text{де } \beta = \frac{v}{c} \right). \quad (34)$$

або:

$$\frac{\lambda}{\lambda'} = \frac{1 - \frac{v w}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}. \quad (34 \text{ а})$$

Прийнявши знов:

$$w = c,$$

дістаємо:

$$\frac{\lambda'}{\lambda} = \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{v}{c}} \quad (35)$$

Занедбуючи другий і вищий степен дроба β , дістаємо знов знаний взір класичної оптики:

$$\frac{\lambda'}{\lambda} = \frac{1}{1 - \frac{v}{c}} = 1 + \frac{v}{c}. \quad (36)$$

в) Евклідовий простір (x_1, x_2, x_3) — трирозмірний світ (x_1, x_3, t) .

Варта звернути увагу ще на одну звязь в геометрії, яка веде до явища відклонення світляного луча в наслідок релятивного руху глядача.

Підпорядкуймо в евклідовім просторі (x_1, x_2, x_3) співрядній X_2 — вісь часу t трирозмірного світа (x_1, x_3, t) , тоді на основі субституції (14) маємо:

$$x_2 = i c t.$$

Відношення площі (x_1, x_3) простору переносяться безпосередно на площу (x_1, x_3) світа, яка представляє поле фізичальних явищ; площі (x_1, x_2) і (x_3, x_2) задержують свою роль як в просторі (x_1, x_2, x_3) . З огляду на визначення осі X_2 субституцією (14), має з тої причини наш евклідовий простір бігуновий характер.

Скрутимо далі уклад співрядних (x_1, x_2, x_3) (рис. 6.) о кут α в додатнім напрямі около X_3 як осі скруту; отримаємо уклад співрядних

$$(x_1', x_2', x_3'),$$

в яким:

$$x_3' \equiv x_3. \quad (37)$$

А далі поведім в площі (x_2, x_3) просту OP під кутом γ до осі X_2 ; мет її на площу (x_1', x_3') в проста $O'P'$ (рис. 6.), наклонена до осі X_3 під кутом δ . З рисунку 6. маємо:

$$x_2 = x_3 \operatorname{ctg} \gamma \quad (38)$$

і:

$$x_1' = x_2 \sin \alpha = x_3 \operatorname{tg} \delta, \quad (39)$$

з чого:

$$\operatorname{tg} \delta = \sin \alpha \operatorname{ctg} \gamma. \quad (40)$$

Для фізикальної інтерпретації положім як передше в (13):

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{v}{ic}, \quad \operatorname{tg} \gamma = \frac{w}{ic}, \quad (41)$$

тоді з огляду на (17) дістанемо:

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{v}{ic \sqrt{1 - \beta^2}} \frac{ic}{w}$$

або:

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{v}{w \sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (42)$$

де $\beta = \frac{v}{c}$.

В інтерпретації фізики скрут укладу співрядних (x_1, x_2, x_3) около X_3 як осі о кут α означає після (41) рівномірний поступний рух площі (x_1, x_3) в напрямі осі X_1 з релятивною швидкістю v . Проста OP є знов геометричним образом світової лінії проміння світла в додатнім напрямі осі X_3 , а кут її нахилу до осі X_2 означає після (41) швидкість світла w , яка в порожнім просторі є:

$$w = c. \quad (43)$$

Така буде інтерпретація світляного явища глядача, що обсервує перебіг явища в початку układu O у світі (x_1, x_3, t) .

Приймім, що в хвилі появи проміння світла початок рухомого układu O' покривався з початком нерухомого układu O . Глядач, що знаходиться в початку O' układu рухомого заобсервує в світі (x_1', x_3', t) напрям проміння світла як мет його світової лінії на площу (x_1', x_3') в напрямі осі часу T' ; в це, як знаємо, проста $O'P'$; вона визначає напрям світляного проміння, поміченого глядачем рухомого układu. Напрямом його замикає з напрямом проміння нерухомого układu, т. зн. осею X_3 кут δ , який означаємо як кут аберації. Коли у взорі (42) застосуємо реляцію (43), дістанемо для кута аберації δ :

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{v}{c \sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{\beta}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad (44)$$

або з огляду на (17):

$$\sin \delta = \beta, \quad (44 \text{ a})$$

де: $\beta = \frac{v}{c}$.

Пропускаючи β^2 як дуже малий дріб, дістаємо:

$$\operatorname{tg} \delta = \beta = \frac{v}{c}, \quad (45)$$

взір добре знаний з класичної оптики.

В. Неевклідова геометрія а світ загальної теорії релятивності.

*Відтворення світа матеріяльної точки в спочинку на оборотовій
поверхні.*

Зауважмо світ матеріяльної нерухомої точки і обмежм його знов до двох розмірів; в таким разі маємо в нім до діла з однорозмірними явищами, отже з радіяльним рухом в поли діланія матеріяльної точки. Для визначення міри сього дворозмірного світа не буде вже можна ужити метричної основної форми (8) евклідової геометрії, якою послуговується спеціальна теорія релятивності. Але в можливе відтворувати який дворозмірний світ на кривій поверхні в трирозмірнім евклідовім просторі. Тоді кождому заковови фізики мусить відповідати твердження, яке належить до геометрії тої кривої по-

верхні. Тому необхідним показується, зазнайомитися з геометрією такої кривої поверхні, щоби послугуючись двійнуванням дійти до фізикальної правильности.

Вже Гавсс в своїй „теорії поверхні“ (Flächentheorie) опрацював зовсім загально геометрію на довільній кривій поверхні. В сей спосіб подав він основу метрики кривих поверхний, якої висловом є квадратна ріжничкова форма:

$$ds^2 = g_{11} dx_1^2 + 2 g_{12} dx_1 dx_2 + g_{22} dx_2^2; \quad (46)$$

вона заступає пітагорейську теорему евклідової площі. Квадрат елемента лука ds є функцією dx_1 і dx_2 , а також представляє місцеву функцію, о скільки співчинники g_{11} , g_{12} , g_{22} є функціями x_1 і x_2 .

Возьмім як примір оборотову поверхню (що в дальших уступах використаємо). Най ϱ означає радіальну співрядну, змірену прямо до оборотової осі, z — співрядну в напрямі оборотової осі (вісь Z), а φ — кут, який рахуємо від якогось означеного зероного полуденника. Тоді в загальній формі рівняння кривої полуденника виглядає:

$$z = f(\varrho), \quad (47)$$

а квадрат лука (46) приймає знаний вид:

$$ds^2 = \left[1 + \left(\frac{df}{d\varrho} \right)^2 \right] d\varrho^2 + \varrho^2 d\varphi^2. \quad (48)$$

Вернім знов до питання поля матеріяльної точки. Стосуючи звичайні співрядні бігунові: r , ϑ , ψ і час t для визначення квадрату лінійного елемента світа для масового осередка в спочинку, дістанемо по думці загальної теорії релятивности:

$$ds^2 = \frac{dr^2}{1 - \frac{\alpha}{r}} + r^2 (d\vartheta^2 + \sin^2 \vartheta d\psi^2) - c^2 \left(1 - \frac{\alpha}{r} \right) dt^2, \quad (49)$$

де α означає промінь гравітаційного ділання поля; він є звязаний з масою m клясичної динаміки реляцією:

$$\alpha = 2 \frac{km}{c^2} = 1.48 \cdot 10^{-28} m^2, \quad (50)$$

¹⁾ Н. Bauer: *Matemat. Einführung in die Gravitationstheorie Einsteins* nebst u. s. w. 1922. S. 54. 62.

²⁾ Ibidem, pp. 60.

де співчинник $k = 6.68 \cdot 10^{-8} \text{ cm}^2 \text{ gr}^{-1} \text{ sec}^{-2}$, означає гравітаційну постійну, а $c = 3 \cdot 10^{10} \text{ cm sec}^{-1}$, швидкість світла.

Для явищ, які відбуваються тільки в радіальній напрямі, треба у рівнянні (49) покласти:

$$d\vartheta = d\psi = 0,$$

тоді дістанемо:

$$ds^2 = \frac{dr^2}{1 - \frac{\alpha}{r}} - c^2 \left(1 - \frac{\alpha}{r}\right) dt^2, \quad (49 \text{ a})$$

як визначення міри для дворовмірного світа масової точки.

Застосуємо далі трансформацію:

$$\varphi = it, \quad (51)$$

аналогічну до трансформації (7) Мінковського, тоді (49 а) переходить в квадрат лінійного елемента кривої поверхні в трирозмірному просторі Евкліда, а саме:

$$ds^2 = \frac{dr^2}{1 - \frac{\alpha}{r}} + c^2 \left(1 - \frac{\alpha}{r}\right) d\varphi^2. \quad (52)$$

Згадану криву поверхню можна легко відтворити на оборотній поверхні особливого роду.

В такому випадку треба прийняти:

$$\varrho = c \sqrt{1 - \frac{\alpha}{r}}, \quad (53)$$

або:

$$\frac{\alpha}{r} = 1 - \frac{\varrho^2}{c^2},$$

і утворити:

$$\frac{d\varrho}{dr} = \frac{\alpha c}{2 r^2 \sqrt{1 - \frac{\alpha}{r}}}$$

або:

$$\frac{d\varrho}{dr} = \frac{c^2}{2 \alpha \varrho} \left(1 - \frac{\varrho^2}{c^2}\right)^2 \quad (54)$$

Підставивши одержані зв'язки (53) і (54) в (52), дістанемо (52) у виді подібним як (48), а саме:

$$ds^2 = \frac{4 \alpha^2 d\varrho^2}{c^2 \left(1 - \frac{\varrho^2}{c^2}\right)^4} + \varrho^2 d\varphi^2. \quad (55)$$

З порівняння (55) з (48) виходить різничкове рівняння для полуденникової кривої $z = f(\varrho)$ таке:

$$1 + \left(\frac{df}{dt}\right)^2 = \frac{4\alpha^2}{c^2 \left(1 - \frac{\varrho^2}{c^2}\right)^4} = \frac{4r^4}{\alpha^2 c^2}, \quad (56)$$


або:

$$\frac{df}{dt} = \pm \frac{\sqrt{4\frac{\alpha^2}{c^2} - \left(1 - \frac{\varrho^2}{c^2}\right)^4}}{\left(1 - \frac{\varrho^2}{c^2}\right)^2} = \pm \frac{\sqrt{4r^2 - \alpha^2 c^2}}{\alpha c}. \quad (56a)$$

Зі зв'язків (53) і (56a) слідує, що тільки в області

$$c \geq \varrho \geq c \sqrt{1 - \sqrt{\frac{2\alpha}{c}}} \quad (57)$$

полуденникова крива приймає дійсні значення. (Рис. 7.) представляє образ такої кривої для $\frac{\alpha}{c} = \frac{32}{81}$.



(Рис. 7.)

Приклади до двійності геометрії та фізики.

1. Геодетичні лінії на оборотній поверхні — радіальний рух в полі масової точки.

З теорії поверхней знаємо для геодетичних ліній оборотної поверхні різничкове рівняння¹⁾:

¹⁾ Н. Вауер, І. с. рр. 17 і 18.

$$\frac{d\varrho}{d\varphi} = \frac{e}{K} \sqrt{\frac{e^2 - K^2}{1 + \left(\frac{df}{d\varrho}\right)^2}}, \quad (58)$$

де K означає постійну інтегрування.

Означім луковий елемент полуденникової кривої ds_m і порівняймо звязки (52) і (48), то виходить, що:

$$ds_m = d\varrho \sqrt{1 + \left(\frac{df}{d\varrho}\right)^2} = \frac{dr}{\sqrt{1 - \frac{\alpha}{r}}}. \quad (59)$$

В таких разі звязь (58) можна написати у виді:

$$\frac{ds_m}{d\varphi} = \frac{e}{K} \sqrt{e^2 - K^2}. \quad (60)$$

При помочи взорів (51) і (53) переводимо рівняння для геодезичної лінії оборотової поверхні на мову фізики, а саме дістанемо:

$$\frac{ds_m}{dt} = \frac{ic}{K} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{r}} \sqrt{c^2 \left(1 - \frac{\alpha}{r}\right) - K^2}. \quad (61)$$

Елемент ds_m означає також елемент дороги в радіальнім напрямі, отже відношення $\frac{ds_m}{dt}$ представляє скорість руху v в радіальнім напрямі, якої виразом є:

$$v = -\frac{c}{K} \sqrt{\left(1 - \frac{\alpha}{r}\right) \left[K^2 - c^2 \left(1 - \frac{\alpha}{r}\right)\right]}. \quad (62)$$

В нескінченнім віддаленню від масової точки, т. зн. для $\lim v = \infty$ маємо:

$$v_\infty = -\frac{c}{K} \sqrt{K^2 - c^2}.$$

або:

$$K = -\frac{c}{\sqrt{1 - \frac{v_\infty^2}{c^2}}}. \quad (63)$$

Підставивши так визначену відємну вартість для K у (62), отримаємо:

$$v = c \sqrt{\left(1 - \frac{\alpha}{r}\right) \left[1 - \left(1 - \frac{\alpha}{r}\right) \left(1 - \frac{v_\infty^2}{c^2}\right)\right]}, \quad (64)$$

або:

$$v = c \sqrt{\left(1 - \frac{\alpha}{r}\right) \left(\frac{\alpha}{r} + \frac{v_{\infty}^2}{c^2} - \frac{\alpha v_{\infty}^2}{r c^2}\right)}. \quad (64 \text{ а})$$

Пропускаючи виличини, зложені з $\frac{\alpha^2}{r^2}$ і здобутка $\frac{\alpha}{r}$ і $\frac{v_{\infty}^2}{c^2}$ як нескінченно малі, дістанемо з (64 а) вартість для v в першій приближенню:

$$v = c \sqrt{\frac{\alpha}{r} + \frac{v_{\infty}^2}{c^2}} \quad (65)$$

Піднесім останнє вираження до квадрату і поділім на 2, дістанемо:

$$\frac{v^2}{2} - \frac{\alpha c^2}{2r} = \frac{v_{\infty}^2}{2} = W (\text{const}), \quad (65 \text{ а})$$

т. зн. вираження енергії класичної механіки; другий член (65 а) представляє після (50):

$$- \frac{\alpha c^2}{2r} = K \frac{m}{r} = V, \quad (65)$$

т. є. гравітаційний потенціал Ньютона. В такім разі (65 а) приймає вид:

$$\frac{v^2}{2} = \frac{v_{\infty}^2}{2} = V. \quad (65 \text{ в})$$

Визначім дальше гравітаційне прискорення γ . З огляду на (59) і (64 а) маємо:

$$\begin{aligned} \gamma &= \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dr} \frac{dr}{dt} = \frac{dv}{dr} \frac{ds_m}{dt} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{r}} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{r}} \frac{d(v^2)}{dr} \end{aligned} \quad (67)$$

а дальше:

$$\gamma = - \frac{\alpha c^2}{2r^2} \sqrt{1 - \frac{\alpha}{r}} \left(1 - \frac{2\alpha}{r} - \frac{2v_{\infty}^2}{c^2} + \frac{2\alpha v_{\infty}^2}{r c^2}\right). \quad (68)$$

Абстрагуючи від знаку і стосуючи (50), дістанемо з останнього рівняння в першій приближенню нютонівську вартість прискорення тяготіння:

$$g = \frac{\alpha c^2}{2r^2} = k \frac{m}{r^2}. \quad (69)$$

2. Стіжок стичности на рівнобіжнику оборотової поверхні — однорodne поле тяготіння.

а) Sinus половини кута стіжка стичности — прискорення тяготіння Ньютона.

Зауважмо оборотовий стіжок, виставлений на рівнобіжнику оборотової поверхні $z = f(\varrho)$, якого промінь виносить:

$$\varrho_0 = c \sqrt{2 - \frac{\alpha}{r_0}}, \quad (70)$$

тоді для нього маємо:

$$\frac{df}{d\varrho} = \text{const.}$$

Означім даліше 2ω як кут осевого перерізу стіжка, тоді дістанемо зв'язь, яку бачимо на (рис. 7.), а саме:

$$\frac{df}{d\varrho} = \text{tg } \varepsilon = \text{tg } \omega; \quad (71)$$

з того знов дістанемо:

$$1 + \left(\frac{df}{d\varrho}\right)^2 = 1 + \text{ctg}^2 \omega = \frac{1}{\sin^2 \omega}. \quad (71a)$$

Коли в рівнянню (56) напишемо r_0 місто r [стосовно до (70)] і порівнаємо його з (71a), тоді отримаємо:

$$\frac{1}{\sin \omega} = \frac{2r_0^2}{\alpha c}$$

або:

$$\sin \omega = \frac{\alpha c}{2r_0^2}. \quad (72)$$

Порівнюючи знов (72) з (69), маємо:

$$g = c \sin \omega, \quad (73)$$

т. зн. sinus половини кута стіжка стичности, є пропорційний до прискорення тяготіння g Ньютона в одроднім полі.

б) Геодетичні лінії оборотового стіжка — свобідне падання.

Ріжничкове рівняння геодетичних ліній стичного стіжка виходить з взору (58) при застосуванню зв'язку (71a), отже:

$$\frac{d\varrho}{d\varphi} = \frac{\varrho \sin \omega}{K} \sqrt{\varrho^2 - K}, \quad (74)$$

або:

$$\frac{K}{e^2 \sqrt{1 - \frac{K^2}{e^2}}} = \sin \omega d\varphi. \quad (74 \text{ а})$$

По з'інтегруванню отримаємо:

$$(\varphi - \varphi_0) \sin \omega = \arccos \frac{K}{e}, \quad (75)$$

або:

$$e \cos [(\varphi - \varphi_0) \sin \omega] = K, \quad (75 \text{ а})$$

де φ_0 є постійною інтегрування. Коли зложимо, що для $\varphi = \varphi_0$ приймає вартість $e = e_0$, то в такому разі:

$$K = e_0. \quad (76)$$

Рівняння (75 а) приймає тоді вид:

$$e \cos [(\varphi - \varphi_0) \sin \omega] = e_0. \quad (77)$$

Коли до останнього рівняння введемо взір трансформаційний:

$$\varphi_0 = i t_0 \quad (78)$$

і застосуємо попередні взори (53), (70) і (73), тоді (77) напишемо у виді:

$$\sqrt{1 - \frac{2gr_0}{c^2}} = \sqrt{1 - \frac{2gr_0^2}{c^2 r}} \cos \left[i(t - t_0) \frac{g}{c} \right]. \quad (79)$$

Знаючи однак, що:

$$\cos ix = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

можемо (79) написати також у виді:

$$\sqrt{1 - \frac{2gr_0}{c^2}} = \sqrt{1 - \frac{2gr_0^2}{c^2 r^2}} \left[e^{\frac{g}{c}(t-t_0)} + e^{-\frac{g}{c}(t-t_0)} \right]. \quad (80)$$

Отримане рівняння визначає нам рух матеріальної точки в однороднім полі тяготіння з нютонівським прискоренням з погляду загальної теорії релятивності є це релятивістичне представлення свобідного падання. r_0 є ту відступом (і то дуже великим) вихідної точки руху від маси, що витворює поле; отже:

$$r_0 - r = s \ll r_0 \quad (81)$$

означає в першій приближенню дорогу, відбуту свобідним паданням.

В кінці звернім ще увагу на перехід до класичної фізики. Дістанемо се, коли $\frac{g}{c}$ і $\frac{s}{r_0}$ уважатимемо як малі величини першого ряду і обчислимо (80) з огляду на (81) в першій приближенню; тоді знайдемо:

$$\frac{r_0}{r} = \frac{r_0}{r_0 - s} \sim 1 + \frac{s}{r_0}. \quad (82)$$

Положимо далі для упрощення:

$$t_0 = 0, \quad (83)$$

тоді з (80) дістанемо:

$$1 - \frac{g r_0}{c^2} = \frac{1}{2} \left[1 - \frac{g r_0}{c^2} \left(1 + \frac{s}{r_0} \right) \right] \left(2 + \frac{g^2}{c^2} t^2 \right),$$

або:

$$1 - \frac{g r_0}{c^2} = 1 - \frac{g r_0}{c^2} - \frac{g}{c^2} s + \frac{g^2}{2 c^2} t^2$$

та нарешті:

$$s = \frac{g}{2} t^2, \quad (84)$$

т. зв. знаний взір на дорогу свободного падання класичної механіки.

У Львові, в травні 1928 р.