

СКІЛЬКИ ЗБІЖНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ НЕОБХІДНО ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗРИВУ ФУНКЦІЇ В ТОЧЦІ?

Тарас БАНАХ, Любомир ЗДОМСЬКИЙ, Сергій ПІДКУЙКО

Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Університетська 1, Львів 79602

Редакція отримала статтю 26 січня 2004 р.

Сім'я \mathcal{F} підмножин метричного сепарабельного простору X називається *визначальною* в точці $x_0 \in X$, якщо неперервна у виколотому околі точки x_0 функція $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ є неперервною в x_0 тоді й лише тоді, коли звуження $f|_{S \cup \{x_0\}}$ є неперервними в x_0 для кожної множини $S \in \mathcal{F}$. Доведено, що найменша потужність $|\mathcal{F}|$ визначальної в x_0 сім'ї \mathcal{F} збіжних до x_0 послідовностей дорівнює малому кардиналові \mathfrak{b} , за умови, що жодна збіжна послідовність в X не є околотою x_0 . Для спадної до нуля послідовності $S = \{x_n\}_{n \in \omega} \subset (0, 1]$ такої, що $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}/x_n = 1$, доведено, що сім'я $\mathcal{F} = \{bS : b \in B\}$ визначальна в $x_0 = 0$ для кожної множини $B \subset (0, \infty)$ другої категорії Бера.

Добре відомо, що функція дійсної змінної $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ є неперервною в точці $x_0 \in \mathbb{R}$ тоді й лише тоді, коли $f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ для кожної збіжної до x_0 послідовності $(x_n)_{n=1}^{\infty}$. У цьому контексті постає природне запитання: скільки збіжних до x_0 послідовностей досить взяти, щоб визначити, чи є довільна функція f неперервною в точці x_0 ? Якщо не накладати жодних обмежень на f , то відповідь очевидна: потрібно континуум таких послідовностей. Набагато цікавішим є питання у випадку, коли функція f є неперервною у виколотому околі x_0 . У цьому випадку

1991 Mathematics Subject Classification. 03E17, 03E35, 03E50, 26A03, 26A12, 26A15, 40A05, 54A25, 54A35, 54C05, 54C30, 54E35

Перший автор частково підтриманий україно-словенським дослідницьким грантом SLO-UKR 02-03/04.

мінімальна кількість послідовностей, за допомогою яких можна встановити неперервність таких функцій в x_0 , дорівнює малому кардиналу \mathfrak{b} , добре відомому в теорії множин.

Нагадаємо означення цього кардинала. Будемо говорити, що послідовність $(x_n) \in \mathbb{N}^\omega$ домінує послідовність $(y_n) \in \mathbb{N}^\omega$ (і позначати це символом $(y_n) \leq^* (x_n)$), якщо $y_n \leq x_n$ для всіх достатньо великих чисел n . Добре відомо, що, маючи зліченну сім'ю послідовностей $\mathcal{F} \subset \mathbb{N}^\omega$, можна знайти послідовність $(y_n) \in \mathbb{N}^\omega$, яка домінує кожну послідовність (x_n) з множини \mathcal{F} . Найменша потужність $|\mathcal{F}|$ множини $\mathcal{F} \subset \mathbb{N}^\omega$, для якої не існує такої послідовності (y_n) , і є кардиналом \mathfrak{b} .

Більш формально, кардинал \mathfrak{b} дорівнює найменшій потужності $|B|$ множини $B \subset \mathbb{N}^\omega$, яка є необмеженою в $(\mathbb{N}^\omega, \leq^*)$ у тому сенсі, що не існує послідовності $(y_n) \in \mathbb{N}^\omega$ такої, що $(x_n) \leq^* (y_n)$ для всіх $(x_n) \in B$.

Кардинал \mathfrak{b} належить до категорії так званих малих кардиналів, тобто незліченних кардиналів, що не перевищують континуума \mathfrak{c} . Точне розташування цього кардинала на відрізку $[\aleph_1, \mathfrak{c}]$ залежить від додаткових теоретико-множинних припущень. Зокрема, $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$ при Аксиомі Мартіна. Проте існують моделі ZFC, у яких $\mathfrak{b} < \mathfrak{c}$ (див. [5], [8]).

Поглянемо на описану вище проблему з дещо загальнішої точки зору.

Означення 1. Сім'ю \mathcal{F} підмножин метричного простору X будемо називати

- *визначальною в точці* $x_0 \in X$, якщо довільна неперервна у виколотому околі x_0 функція $f : X \rightarrow [-1, 1]$ є неперервною в точці x_0 тоді й лише тоді, коли для кожної множини $S \in \mathcal{F}$ звуження $f|_{S \cup \{x_0\}}$ — неперервне в x_0 ;
- *κ -контролюючою в точці* $x_0 \in X$, де κ — кардинал, якщо для довільної сім'ї \mathcal{U} відкритих підмножин $X \setminus \{x_0\}$ з $|\mathcal{U}| \leq \kappa$ і $x_0 \in \bigcap_{U \in \mathcal{U}} \text{cl}_X(U)$ існує така множина $S \in \mathcal{F}$, що $x_0 \in \text{cl}_X(U \cap S)$ для кожного $U \in \mathcal{U}$.

Під *характером* $\chi(x_0, X)$ точки x_0 топологічного простору X розуміємо мінімальну потужність бази околів x_0 (див. [3, §1.1]). Наступне твердження розкриває взаємозв'язки між означеними вище поняттями.

Твердження. *Нехай \mathcal{F} — сім'я підмножин у тихоновському просторі X з відміченою точкою x_0 зліченного характеру $\chi(x_0, X)$ в X .*

1. *Якщо сім'я \mathcal{F} є визначальною в точці x_0 , то вона є 1-контролюючою в x_0 .*

2. Сім'я \mathcal{F} є визначальною в точці x_0 , якщо вона є 2-контролюючою в x_0 .
3. Якщо сім'я \mathcal{F} є κ -контролюючою в точці x_0 , то вона є λ -контролюючою для кожного кардинала $\lambda \leq \kappa$.
4. Якщо сім'я \mathcal{F} є 1-контролюючою в точці x_0 , а $\{O_n : n \in \omega\}$ – зліченна база околів точки x_0 в X , то сім'я $\{\bigcup_{n \in \omega} O_n \cap A_n : \forall n \in \omega \ A_n \in \mathcal{F}\}$ є ω -контролюючою в x_0 .

Доведення. (1) Припустимо, що сім'я \mathcal{F} є визначальною в точці x_0 . Щоб довести, що вона є 1-контролюючою, зафіксуємо відкриту підмножину $U \subset X$ з $x_0 \in \text{cl}_X(U)$.

Нехай $\{O_n : n \in \omega\}$ – зліченна база околів точки x_0 в X . Для кожного $n \in \omega$ виберемо точку $a_n \in O_n \cap U$. Без обмеження загальності можна вважати, що ці точки попарно різні. Використовуючи *тихоновівість* простору X , виберемо попарно неперетинні околи $O(a_n) \subset U \cap O_n$ точок a_n , $n \in \omega$, і для кожного $n \in \omega$ знайдемо таку неперервну функцію $f_n : X \rightarrow [0, 1]$, що $f_n(a_n) = 1$ і $f_n^{-1}(0, 1] \subset O(a_n)$. Легко бачити, що функція $f = \sum_{n=1}^{\infty} f_{2n} : X \rightarrow [0, 1]$ є неперервною у всіх точках простору X , крім x_0 . Тепер із визначальності сім'ї \mathcal{F} випливає існування такого $S \in \mathcal{F}$, що звуження f на $S \cup \{x_0\}$ є розривним. Оскільки $f|_{X \setminus U} \equiv 0$, то точка x_0 дотикається до перетину $S \cap U \supset S \cap f^{-1}(0, 1]$.

(2) Тепер припустимо, що сім'я \mathcal{F} є 2-контролюючою в точці x_0 . Щоб довести її визначальність, зафіксуємо довільну неперервну у виколотому околі x_0 функцію $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, яка є розривною в x_0 . Якщо існує границя $\lim_{x_0 \neq x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$, то для довільного $S \in \mathcal{F}$ з $x_0 \in \text{cl}_X(S)$ звуження $f|_{S \cup \{x_0\}}$ є розривним. Якщо ж границя $\lim_{x_0 \neq x \rightarrow x_0} f(x)$ не існує, то можна знайти дві відкриті множини $U_1, U_2 \subset \mathbb{R}$ з неперетинними замиканнями, прообрази $f^{-1}(U_i)$, $i \in \{1, 2\}$, яких дотикаються до точки x_0 . Нехай $\dot{O}x_0$ – виколотий окіл x_0 , у якому функція f є неперервною. Застосовуючи 2-контролюючу властивість сім'ї \mathcal{F} до відкритих множин $f^{-1}(U_i) \cap \dot{O}x_0$, $i \in \{1, 2\}$, знайдемо таку множину $S \in \mathcal{F}$, що перетини $S \cap f^{-1}(U_i) \cap \dot{O}x_0$, $i \in \{1, 2\}$, дотикаються до точки x_0 . Очевидно, що звуження $f|_{S \cup \{x_0\}}$ є розривним.

Останні два пункти твердження 1 є очевидними.

Позначимо через $s_f(x_0, X)$ (відповідно, $s_\kappa(x_0, X)$) найменшу потужність $|\mathcal{F}|$ сім'ї \mathcal{F} збіжних до x_0 послідовностей, яка є визначальною (відповідно, κ -контролюючою) в точці x_0 .

Із твердження 1 випливає

Наслідок 1. Якщо x_0 – точка зліченного характеру у тихоновському просторі X , то $s_f(x_0, X) = s_\kappa(x_0, X)$ для кожного $\kappa \in \mathbb{N}$ і $s_f(x_0, X) \leq s_\omega(x_0, X) \leq s_f(x_0, X)^\omega$.

Для метричних сепарабельних просторів вдається знайти точне значення кардиналів $s_\kappa(x_0, X)$, $\kappa \leq \omega$. У подальшому викладі нам знадобляться такі поняття.

Будемо називати підмножину $S \subset X$ топологічного простору X *послідовністю, збіжною до x_0* , якщо доповнення $S \setminus O(x_0)$ — скінченне для довільного околу $O(x_0)$ точки x_0 в X .

Підмножину S метричного простору (X, d) назвемо *узагальненою послідовністю, що прямує до x_0* , якщо для довільного околу $O(x_0) \subset X$ точки x_0 доповнення $S \setminus O(x_0)$ — рівномірно дискретне у тому сенсі, що $\inf\{d(x, y) : x, y \in S \setminus O(x_0), x \neq y\} > 0$. Зауважимо, що ці два поняття співпадають у цілком обмежених метричних просторах.

Теорема 1. Нехай x_0 – неізолювана точка метричного простору X і $\kappa < \mathfrak{b}$ – ненульовий кардинал. Якщо x_0 має окіл $O(x_0)$, що є збіжною до x_0 послідовністю, то $s_f(x_0, X) = s_\kappa(x_0, X) = 1$. Якщо такого околу не існує, то $s_f(x_0, X) = s_\kappa(x_0, X) = \mathfrak{b}$.

Розіб'ємо доведення цієї теореми на декілька допоміжних лем. Але спочатку введемо деякі позначення. Для точки x_0 метричного простору (X, d) та підмножини $S \subset X$ з $x_0 \in S$ розглянемо *функцію віддалі від S* ,

$$\text{dist}_S : X \rightarrow [0, \infty), \quad \text{dist} : x \mapsto \text{dist}(x, S) = \inf_{s \in S} d(s, x),$$

а також (неспадну) *функцію росту* цієї віддалі,

$$\rho_S : (0, \infty) \rightarrow [0, \infty), \quad \rho_S : R \mapsto \sup_{d(x, x_0) \leq R} \text{dist}(x, S).$$

Якщо S не є околом x_0 , то $\rho_S(0, \infty) \subset (0, \infty)$.

Лема 1. Нехай x_0 – неізолювана точка метричного простору (X, d) . Для довільної неспадної функції $f : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ існує така збіжна до x_0 узагальнена послідовність $S \subset X$, що $\rho_S < 2f$.

Доведення. Покладемо $O_n = \{x \in X : d(x, x_0) < 2^{-n}\}$ для $n \geq 0$. Назвемо підмножину $A \subset X$ ε -розділеною для деякого $\varepsilon > 0$, якщо $d(a, b) \geq \varepsilon$ для всіх різних точок $a, b \in A$. Нехай S_0 — максимальна $f(1)$ -розділена підмножина $X \setminus O_0$. Індукцією за n побудуємо послідовність

множин $(S_n)_{n \geq 1}$ таку, що $S_n \subset O_{n-1} \setminus O_n$ — максимальна множина, для якої об'єднання $S_0 \cup \dots \cup S_n \in f(2^{-n})$ -розділенням. Тоді об'єднання $S = \bigcup_{n \in \omega} S_n$ є узагальненою послідовністю, що збігається до x_0 , до того ж, $\rho_S(t) < 2f(t)$ для всіх $t \in (0, \infty)$.

Будемо говорити, що сім'я \mathcal{F} неспадних невід'ємних функцій на $\mathbb{R}_+ = (0, \infty)$ є обмеженою знизу за спаданням, якщо існує така неспадна функція $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, що $g = o(f)$, $t \rightarrow 0_+$, для кожної функції $f \in \mathcal{F}$. Використовуючи означення кардинала \mathfrak{b} , нескладно довести наступне його еквівалентне означення.

Лема 2. Кардинал \mathfrak{b} дорівнює мінімальній потужності $|\mathcal{F}|$ сім'ї \mathcal{F} додатних неспадних функцій на \mathbb{R}_+ , яка є необмеженою знизу за спаданням.

Використовуючи це еквівалентне означення, опишемо метод побудови контролюючих сімей малої потужності.

Лема 3. Нехай \mathcal{F} — така сім'я збіжних до x_0 послідовностей у метричному просторі (X, d) , що множина функцій $\{\rho_S : S \in \mathcal{F}\}$ — необмежена знизу за спаданням. Тоді сім'я \mathcal{F} є κ -контролюючою для кожного кардинала $\kappa < \mathfrak{b}$.

Доведення. Припустимо, що множина функцій $\{\rho_S : S \in \mathcal{F}\}$ — необмежена знизу за спаданням. Зафіксуємо сім'ю \mathcal{U} відкритих підмножин $X \setminus \{x_0\}$, які дотикаються до точки x_0 , і припустимо, що $|\mathcal{U}| < \mathfrak{b}$. Розглянемо сім'ю функцій $\{\rho_{X \setminus U} : U \in \mathcal{U}\}$. Оскільки ця сім'я має потужність $< \mathfrak{b}$, то вона обмежена знизу за спаданням, звідки випливає існування такої неспадної функції $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, що $f = o(\rho_{X \setminus U})$, $t \rightarrow 0_+$, для кожного $U \in \mathcal{U}$.

Оскільки сім'я функцій $\{\rho_S : S \in \mathcal{F}\}$ — необмежена знизу за спаданням, то існує така послідовність $S \in \mathcal{F}$, що $f \neq o(\rho_S)$, $t \rightarrow 0_+$, тобто

$$\overline{\lim}_{t \rightarrow +0} \frac{f(t)}{\rho_S(t)} = C > 0. \quad (1)$$

Для завершення доведення досить перевірити, що для кожної множини $U \in \mathcal{U}$ перетин $S \cap U$ — нескінченний. Із (1) випливає існування такої збіжної до нуля послідовності $(t_k) \subset (0, \infty)$, що $f(t_k) > (C/2)\rho_S(t_k)$ для всіх k . Оскільки $f = o(\rho_{X \setminus U})$ при $t \rightarrow 0_+$, то існує таке k_0 , що $f(t_k) < (C/4)\rho_{X \setminus U}(t_k)$ для всіх $k \geq k_0$. Як наслідок, $(C/2)\rho_S(t_k) < (C/4)\rho_{X \setminus U}(t_k)$ і $\rho_{X \setminus U}(t_k) > 2\rho_S(t_k)$ для всіх $k \geq k_0$. Використовуючи означення величини $\rho_{X \setminus U}(t_k) > 2\rho_S(t_k)$, виберемо таку точку $x_k \in X$, що $d(x_k, x_0) \leq t_k$

і $d(x_k, X \setminus U) > \rho_S(t_k)$. Із означення $\rho_S(t_k)$ випливає існування точки $s_k \in S$ на відстані $d(x_k, s_k) < d(x_k, X \setminus U) \leq \rho_{X \setminus U}(t_k)$. Тоді $s_k \in U$ і перетин $U \cap S$ — нескінченний, оскільки він містить збіжну до x_0 послідовність $(s_k)_{k \geq k_0}$.

Перейдемо тепер безпосередньо до доведення теореми 1.

Доведення теореми 1. Нехай $x_0 \in X$ — неізолювана точка сепарабельного метризовного простору X . Фіксуємо довільну цілком обмежену метрику d в X , що породжує топологію простору X . Випадок околу $O(x_0)$, що є збіжною послідовністю — тривіальний. Тому далі вважаємо, що жоден окіл $O(x_0)$ точки x_0 в X не є збіжною послідовністю. Згідно із наслідком 1, досить довести оцінки $\mathfrak{b} \leq s_1(x_0, X) \leq s_\omega(x_0, X) \leq \mathfrak{b}$. З лем 1 і 2 випливає існування такої сім'ї \mathcal{F} збіжних до x_0 послідовностей, що $|\mathcal{F}| \leq \mathfrak{b}$ і множина функцій $\{\rho_S : S \in \mathcal{F}\}$ — необмежена знизу за спаданням. Застосовуючи лему 3, отримуємо, що сім'я \mathcal{F} є ω -контролюючою, і, отже, $s_\omega(x_0, X) \leq |\mathcal{F}| \leq \mathfrak{b}$.

Для доведення нерівності $\mathfrak{b} \leq s_1(x_0, x)$ досить показати, що довільна сім'я \mathcal{F} збіжних до x_0 послідовностей не є 1-контролюючою, якщо $|\mathcal{F}| < \mathfrak{b}$. Позначимо через K поповнення цілком обмеженого метричного простору X . Оскільки точка x_0 не має околів, що є збіжними до x_0 послідовностями, то існує збіжна до x_0 послідовність $(y_n) \subset K \setminus \{x_0\}$ неізолюваних точок компакта K . Покладемо $Y = \{x_0, y_n : n \in \omega\}$. Для кожної послідовності $S \in \mathcal{F}$ виберемо послідовність $\vec{m}^S = (m_i^S) \in \mathbb{N}^\omega$ так, щоб для довільних $i \in \omega$ та $s \in S \setminus Y$ справджувалася нерівність $d(s, y_i) > 2^{-m_i^S}$. Оскільки множина послідовностей $B = \{\vec{m}^S : S \in \mathcal{F}\} \subset \mathbb{N}^\omega$ має потужність $|B| \leq |\mathcal{F}| < \mathfrak{b}$, то існує така послідовність $\vec{m} = (m_i) \in \mathbb{N}^\omega$, що $\vec{m}^S \leq^* \vec{m}$ для всіх $S \in \mathcal{F}$. Тепер розглянемо відкриту множину $W = \bigcup_{i \in \omega} B(y_i, 2^{-m_i})$, яка містить x_0 у своєму замиканні. З вибору послідовностей $\vec{m}^S \leq^* \vec{m}$ випливає, що для кожної послідовності $S \in \mathcal{F}$ перетин $S \cap W$ — скінченний. Це означає, що сім'я \mathcal{F} не є 1-контролюючою.

З теореми 1 та поведінки кардинала \mathfrak{b} за різних аксіоматичних припущень (див. [8]) випливає

Наслідок 2. Нехай X — метричний сепарабельний простір і $x_0 \in X$ — точка, жоден окіл якої не є збіжною до x_0 послідовністю. Тоді $s_f(x_0, X) = \mathfrak{c}$ при Аксіомі Мартіна. Проте існують моделі ZFC, при яких $s_f(x_0, X) < \mathfrak{c}$.

Застосовуючи теорему 1 до точки $x_0 = 0$ відрізка $X = [0, 1]$, бачимо, що існує сім'я \mathcal{F} спадних до нуля послідовностей дійсних чисел поту-

жності $|\mathcal{F}| = \mathfrak{b}$, яка дозволяє визначити існування границі в нулі у тому сенсі, що неперервна функція $f : (0, 1] \rightarrow [-1, 1]$ має границю $\lim_{x \rightarrow +0} f(x)$ тоді й лише тоді, коли для кожної послідовності $(x_n) \in \mathcal{F}$ існує границя $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$. Однак, побудована у доведенні цієї теореми сім'я \mathcal{F} містить як завгодно повільно спадні до нуля послідовності. Виявляється, що можна також знайти *одну* збіжну до нуля послідовність $(x_n) \subset [0, \infty)$, сім'я $\mathfrak{H} = \{(ax_n)_{n \in \omega} : a > 0\}$ гомотетичних копій якої є ω -контролюючою (і, як наслідок, визначальною) в точці $x_0 = 0$. Тоді усі послідовності цієї сім'ї еквівалентні в тому сенсі, що $\vec{x} = O^*(\vec{y})$ для $\vec{x}, \vec{y} \in \mathfrak{H}$. При дослідженні структури таких послідовностей (x_n) природно виникають ще три малих кардинали: $\text{add}(\mathfrak{M})$, $\text{non}(\mathfrak{M})$ та $\text{cov}(\mathfrak{M})$. Тут \mathfrak{M} – σ -ідеал усіх множин I-ї категорії Бера на прямій, а

$$\text{add}(\mathfrak{M}) = \min\{|\mathcal{I}| : \mathcal{I} \subset \mathfrak{M}, \cup \mathcal{I} \notin \mathfrak{M}\};$$

$$\text{non}(\mathfrak{M}) = \min\{|A| : A \subset \mathbb{R}, A \notin \mathfrak{M}\};$$

$$\text{cov}(\mathfrak{M}) = \min\{|\mathcal{I}| : \mathcal{I} \subset \mathfrak{M}, \cup \mathcal{I} = \mathbb{R}\}.$$

Для цих кардиналів очевидно, що $\text{add}(\mathfrak{M}) \leq \min\{\text{non}(\mathfrak{M}), \text{cov}(\mathfrak{M})\} \leq \mathfrak{c}$. Менш очевидно, що $\text{add}(\mathfrak{M}) \leq \mathfrak{b} \leq \text{non}(\mathfrak{M})$ (див. [8]) (це впливає з того, що σ -ідеал \mathfrak{M} містить усі компактні підмножини множини ірраціональних чисел, яка гомеоморфна зліченному добутку \mathbb{N}^ω за теоремою Александрова–Урисона [6, 7.7]). При Аксиомі Мартіна усі ці кардинали дорівнюють континууму, проте існують моделі ZFC, за яких $\max\{\text{cov}(\mathfrak{M}), \text{non}(\mathfrak{M})\} < \mathfrak{c}$ (див. [8]).

Теорема 2. *Для спадної до нуля послідовності $S = (x_n)_{n=1}^\infty$ додатних дійсних чисел наступні умови є еквівалентними:*

1. $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$;
2. для кожної відкритої множини $U \subset (0, \infty)$, яка дотикається до нуля, множина $\{a > 0 : aS \cap U \neq \emptyset\}$ є відкритою і всюди щільною на півосі $\mathbb{R}_+ = (0, +\infty)$;
3. сім'я $\mathcal{F} = \{aS : a \in \mathbb{R}_+\}$ є ω -контролюючою в точці $x_0 = 0$;
4. для кожної відкритої множини $U \ni 1$ на півосі \mathbb{R}_+ сім'я $\mathcal{F} = \{aS : a \in U\}$ є визначальною в точці $x_0 = 0$;
5. для кожної множини B другої категорії Бера на осі \mathbb{R}_+ сім'я $\mathcal{F} = \{aS : a \in B\}$ є визначальною в точці $x_0 = 0$.

6. для кожної відкритої множини $W \ni 1$ на півосі \mathbb{R}_+ сім'я $\mathcal{F} = \{aS : a \in W\}$ є κ -контролюючою в точці $x_0 = 0$ для кожного нескінченного кардинала $\kappa < \text{cov}(\mathfrak{M})$;
7. для кожної множини B другої категорії Бера на осі \mathbb{R}_+ сім'я $\mathcal{F} = \{bS : b \in B\}$ є κ -контролюючою в точці $x_0 = 0$ для кожного нескінченного кардинала $\kappa < \text{add}(\mathfrak{M})$.

Доведення. Встановимо імплікації $(1) \Rightarrow (2) \Leftrightarrow (3) \Rightarrow (5) \Rightarrow (4) \Rightarrow (1)$ та $(2) \Rightarrow (6,7) \Rightarrow (3)$.

$(1) \Rightarrow (2)$ Припустимо, що існує границя $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$ і зафіксуємо довільну відкриту підмножину $U \subset (0, \infty)$, яка дотикається до нуля. Легко бачити, що множина $A = \{a > 0 : aS \cap U \neq \emptyset\}$ — відкрита в \mathbb{R}_+ . Щоб довести її всюди щільність в \mathbb{R}_+ , зафіксуємо довільну точку $a \in \mathbb{R}_+$ та її оточення $W \subset \mathbb{R}_+$. Знайдемо таке $\varepsilon > 0$, що $(a(1-\varepsilon), a] \subset W$. Далі, підберемо таке $m \in \mathbb{N}$, що $\frac{x_{n+1}}{x_n} > 1 - \varepsilon$ для всіх $n \geq m$. Ми стверджуємо, що WS містить інтервал $(0, ax_m)$. Дійсно, для кожної точки $t \in (0, ax_m)$ можна знайти таке $n \geq m$, що $t \in (ax_{n+1}, ax_n]$. Оскільки

$$\frac{t}{ax_n} > \frac{ax_{n+1}}{ax_n} = \frac{x_{n+1}}{x_n} > 1 - \varepsilon,$$

то $t \in (a(1-\varepsilon), a] \cdot x_n \subset WS$. Із включень $(0, ax_m) \subset WS$ та $0 \in \bar{U}$ випливає, що $WS \cap U \neq \emptyset$, звідки отримуємо, що $W \cap A \neq \emptyset$.

$(2) \Rightarrow (3)$ Нехай $\{U_n : n \in \omega\}$ — зліченна сім'я відкритих підмножин на півосі \mathbb{R}_+ , які дотикаються до нуля. Із умови (2) випливає, що для довільних $n, m \in \omega$ множина $A_{n,m} = \{a > 0 : aS \cap U_n \cap (0, 2^{-m}] \neq \emptyset\}$ — відкрита і всюди щільна на півосі \mathbb{R}_+ . За теоремою Бера, перетин $\bigcap_{n,m \in \omega} A_{n,m}$ містить деяку точку $a > 0$. Для цієї точки усі перетини $aS \cap U_n$ — нескінченні, що доводить ω -контролюючість послідовності S .

$(3) \Rightarrow (2)$ Припустимо, що сім'я $\{aS : a > 0\}$ є ω -контролюючою в $x_0 = 0$. Зафіксуємо довільну відкриту множину $U \subset \mathbb{R}_+$, яка дотикається до нуля. Покажемо, що множина $A = \{a > 0 : aS \cap U \neq \emptyset\}$ — всюди щільна на півосі \mathbb{R}_+ . Позначимо через \mathbb{Q}_+ множину додатних раціональних чисел і розглянемо зліченну сім'ю $\{qU : q \in \mathbb{Q}_+\}$ відкритих множин в \mathbb{R}_+ , які дотикаються до нуля. Оскільки сім'я $\{aS : a > 0\}$ є ω -контролюючою, то існує таке $a > 0$, що $aS \cap qU \neq \emptyset$ для кожного додатного раціонального числа q . Тоді $\mathbb{Q}_+a \in A$ і, отже, множина A — всюди щільна на півосі.

(2) \Rightarrow (5) Припустимо, що функція $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ є неперервною в кожній точці півосі \mathbb{R}_+ , але розривною в $x_0 = 0$. Необхідно знайти таке $b \in B$, що звуження $f|bS \cup \{0\}$ є розривним.

Якщо границя $A = \lim_{x \rightarrow +0} f(x)$ існує, то $A \neq f(x_0)$ і для кожного $b \in B$ звуження $f|bS \cup \{0\}$ є розривним в нулі. Якщо ж границя $\lim_{x \rightarrow +0} f(x)$ не існує, то можна знайти дві відкриті підмножини $U_1, U_2 \subset \mathbb{R}$ з неперетинними замиканнями, прообрази $f^{-1}(U_1), f^{-1}(U_2)$ яких дотикаються до нуля. Із умови (2) випливає, що перетин

$$G = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \bigcap_{i=1}^2 \{a > 0 : aS \cap f^{-1}(U_i) \cap (0, 2^{-n}) \neq \emptyset\}$$

є всюди щільною G_δ -множиною на півосі \mathbb{R}_+ . Тоді для множини B другої категорії Бера перетин $G \cap B$ містить деяку точку $b > 0$. Для цієї константи b послідовність bS має нескінченний перетин з множинами $f^{-1}(U_i)$, $i = 1, 2$. Як наслідок, звуження $f|bS \cup \{0\}$ є розривним в нулі.

Імплікація (5) \Rightarrow (4) є тривіальною. Щоб довести імплікацію (4) \Rightarrow (1), припустимо, що $C = \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} < 1$. Тоді для $\varepsilon = (1 - C)/2$ множина $N = \{n \in \mathbb{N} : x_{n+1} < (1 - \varepsilon)x_n\}$ — нескінченна. Розглянемо відкриту множину $U = \bigcup_{n \in N} ((1 - 2\varepsilon/3)x_n, (1 - \varepsilon/3)x_n)$, яка дотикається до нуля, і зауважимо, що для всіх $a \in (1 - \varepsilon/3, 1 + \varepsilon/3)$ перетин $aS \cap U$ є порожнім. Нехай $f : (0, \infty) \rightarrow [0, 1]$ — неперервна функція з носієм $\overline{f^{-1}(0, 1]} \subset U$, яка не має границі $\lim_{x \rightarrow +0} f(x)$. Доозначимо f в нулі, поклавши $f(0) = 0$. Оскільки $f|aS \equiv 0$, то умова (4) не виконується, що й доводить імплікацію (4) \Rightarrow (1).

(2) \Rightarrow (6,7) Зафіксуємо нескінченний кардинал κ , а також сім'ю \mathcal{U} потужності $|\mathcal{U}| \leq \kappa$, що складається з відкритих підмножин на півосі \mathbb{R}_+ , які дотикаються до нуля. Із умови (2) випливає, що для довільних $U \in \mathcal{U}$, $m \in \omega$ множина $G_{U,m} = \{a > 0 : aS \cap U \cap (0, 2^{-m}) \neq \emptyset\}$ — відкрита і всюди щільна на півосі \mathbb{R}_+ . Зауважимо, що $|\{G_{U,m} : U \in \mathcal{U}, m \in \omega\}| \leq \aleph_0 \cdot |\mathcal{U}| \leq \kappa$ і розглянемо перетин $A = \bigcap \{G_{U,m} : U \in \mathcal{U}, m \in \omega\}$.

Якщо $\kappa < \text{cov}(\mathfrak{M})$, то з означення кардинала $\text{cov}(\mathfrak{M})$ випливає, що множина A всюди щільна на прямій і, отже, має спільну точку a з довільним оточом $W \subset \mathbb{R}_+$ одиниці. Для цієї точки a перетин $aS \cap U$ нескінченний для кожного $U \in \mathcal{U}$. Це означає, що сім'я $\{aS : a \in W\}$ є κ -контролюючою в точці $x_0 = 0$.

Якщо $\kappa < \text{add}(\mathfrak{M})$, то з означення кардинала $\text{cov}(\mathfrak{M})$ випливає, що множина A містить всюди щільну G_δ -множину G півосі \mathbb{R}_+ . Ця множина

$G \subset A$ має спільну точку a з довільною множиною $B \subset \mathbb{R}_+$ другої категорії. Для цієї точки a перетин $aS \cap U$ — нескінченний для кожного $U \in \mathcal{U}$. Це означає, що сім'я $\{aS : a \in B\}$ є κ -контролюючою в точці $x_0 = 0$.

Нарешті, тривіальні імплікації $(6,7) \Rightarrow (3)$ завершують доведення теореми.

Застосовуючи до півосі \mathbb{R}_+ перетворення $\frac{1}{x} : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ та $\ln : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, отримуємо два цікавих наслідки з теореми 2.

Наслідок 3. *Нехай $S = \{x_n : n \in \omega\}$ — зростаюча до нескінченності послідовність дійсних чисел з $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$ і B -множина другої категорії Бера на півосі \mathbb{R}_+ . Неперервна функція $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ має границю $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ тоді і лише тоді, коли для кожного $b \in B$ існує границя $\lim_{n \rightarrow \infty} f(bx_n)$.*

Наслідок 4. *Нехай $S = \{x_n : n \in \omega\}$ — зростаюча до нескінченності послідовність дійсних чисел з $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$ і B -множина другої категорії Бера на півосі \mathbb{R}_+ . Неперервна функція $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ має границю $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ тоді і лише тоді, коли для кожного $b \in B$ існує границя $\lim_{n \rightarrow \infty} f(b + x_n)$.*

Наслідок 3 узагальнює задачу III.2.59* (підвищеної складності) із [2], в якій пропонується довести, що неперервна функція $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ має границю $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ за умови, що $\lim_{n \rightarrow \infty} f(an) = 0$ для всіх $a > 0$. За розв'язком цієї задачі А.Я.Дороговцев відсилає читача до статті [7] та збірника [1, с. 97].

Як видно з теореми 2, для спадної до нуля послідовності $S \subset \mathbb{R}_+$ сім'я $\{aS : a > 0\}$ є ω -контролюючою в нулі тоді і лише тоді, коли множина $\{aS : a \in U\}$ є визначальною в нулі для кожного околу одиниці. Подібна характеристика справедлива і для 1-контролюючої властивості (див. [4]).

Теорема 3. *Для спадної до нуля послідовності $S = \{x_n : n \in \omega\} \subset (0, +\infty)$ сім'я $\{aS : a > 0\}$ є визначальною в нулі тоді і лише тоді, коли вона є 1-контролюючою в нулі. У цьому випадку виконуються оцінки $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln x_n}{\ln n} = 0 < \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$.*

Із теореми 3 випливає, що для послідовності $S = \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$ та довільної множини B другої категорії на \mathbb{R}_+ сім'я $\mathcal{F} = \{bS : b \in B\}$ є визначальною в нулі. Зауважимо, що найменша потужність множини другої категорії на прямій дорівнює кардиналу $\text{pop}(\mathfrak{M})$.

Проблема 1. Нехай \mathcal{F} – визначальна сім'я збіжних до нуля послідовностей на $(0, 1)$, для якої сім'я функцій $\{\rho_S : S \in \mathcal{F}\}$ є обмеженою знизу за спаданням. Чи правда, що $|\mathcal{F}| \geq \text{non}(\mathfrak{M})$?

- [1] *Голузин М.Г., Лоджин А.А., Макаров Б.М., Поджорытов А.Н.* Задачи по математическому анализу. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983.
- [2] *Дороговцев А.Я.* Математический анализ: Сборник задач. – К.: Вища школа, 1987.
- [3] *Энгелькин Р.* Общая топология. – М.: Мир, 1986. – 752 с.
- [4] *Banakh T., Pidkuyko S.* A game characterization of limit-detecting sequences in locally compact G -spaces // Матем. студії (прийнято до друку).
- [5] *van Douwen E.K.* The Integers and Topology. Handbook of Set-Theoretic Topology. – K. Kunen and J.E.Vaughan (eds): Elsevier Sci. Publ., 1984. – 111–167 p.
- [6] *Kechris A.* Classical Descriptive Set Theory, Springer-Verlag, 1995.
- [7] *Leif M.* Om ligelig kontinuitet i uendelig // Nordisk Math. Tidsskr. Bd.24, Hf.2. (1976), 71–74 p.
- [8] *Vaughan J.E.* Small uncountable cardinals and topology. Open problems in topology. – J. van Mill, G.M. Reed (eds): Elsevier Sci. Publ., 1990. – 197–216 p.

HOW MANY CONVERGENT SEQUENCES IS NECESSARY TO DETECT DISCONTINUITY?

Taras BANAKH, Lyubomyr ZDOMSKY, Sergii PIDKUYKO

Ivan Franko Lviv National University
1 Universytetska Str., Lviv 79602, Ukraine

A family \mathcal{F} of subsets of a separable metric space X is called *continuity-detecting* at a point $x_0 \in X$ if each continuous on $X \setminus \{x_0\}$ function $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ is continuous at x_0 if and only if the restriction $f|_{S \cup \{x_0\}}$ is continuous for each $S \in \mathcal{F}$. It is shown that the smallest size $|\mathcal{F}|$ of a continuity-detecting family \mathcal{F} of convergent to x_0 sequences in X is equal to the small cardinal \mathfrak{b} provided no convergent sequence in X is a neighborhood of x_0 . It is proved that for each decreasing to zero sequence $S = \{x_n\}_{n \in \omega} \subset (0, 1]$ with $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1}/x_n = 1$ the family $\mathcal{F} = \{bS : b \in B\}$ is continuity-determining at $x_0 = 0$ for each subset $B \subset (0, \infty)$ of the second Baire category.